

Hunde impfen

Fachlicher Input: Frank Künzel und Elisabeth Baszler (Universitätsklinik für Kleintiere); Redaktionelle Aufbereitung: Julietta Rohrhofer; Grafik: Matthias Moser

Wichtigste Impfungen

Schutz gegen die gefährlichsten Infektionskrankheiten

ACHTUNG Bei viral bedingten Erkrankungen sind nur symptomatische Therapien möglich.

CORE-IMPfung

Staupe*

Canines Staupevirus

Ansteckung

Tröpfcheninfektion; fast ausschließlich durch direkten Kontakt übertragen;

Symptome

betrifft das Atemwegssystem, den Magen-Darm-Trakt und das zentrale Nervensystem.

CORE-IMPfung

Hepatitis Contagiosa Canis*

Canines Adenovirus 1 (CAV-1)

Ansteckung

durch infizierten Urin und Kot;

Symptome

kann zu schweren Leberschäden bis zum Tod führen.

CORE-IMPfung

Parvovirose*

Canines Parvovirus (CPV)

Ansteckung

Hoch ansteckend;

Symptome

schwerwiegende Verläufe v.a. bei jungen Hunden; Flüssigkeitsverlust durch starkes Erbrechen und Durchfall; meist tödlich.

CORE-IMPfung

Leptospirose

Leptospiren

Ansteckung

Erreger häufig in Erde oder stehenden Gewässern;

Symptome

führt zu Leber- und Nierenfunktionsstörungen und Lungenblutungen.

ACHTUNG

Ansteckungsgefahr für Menschen!

CORE-IMPfung

Tollwut

Rabiesvirus

Ansteckung

Übertragung meist durch Bisswunden,

Symptome

führt zu Gehirnentzündung; bei Hunden zu 100% tödlich;

ACHTUNG

Weltweit stirbt alle 10 Minuten ein Mensch an Tollwut.

* Häufig als Kombinationsimpfung „SHP“ verabreicht.

Impfempfehlung

Grundimmunisierung



1. IMPFUNG

8. Lebenswoche

- » Parvovirose
- » Staupe
- » Leptospirose
- » Hepatitis Contagiosa Canis



2. IMPFUNG

12. Lebenswoche

- » Parvovirose
- » Staupe
- » Leptospirose
- » Hepatitis Contagiosa Canis
- » Tollwut



3. IMPFUNG

16. Lebenswoche

- » Parvovirose
- » Staupe
- » Hepatitis Contagiosa Canis



4. IMPFUNG

zwischen 26. und 52. Lebenswoche

- » Parvovirose
- » Staupe
- » Leptospirose
- » Hepatitis Contagiosa Canis
- » ggf. Tollwut*



Wiederholungsimpfungen

nach Abschluss der Grundimmunisierung



jedes Jahr

- » Leptospirose



alle 3 Jahre**

- » Staupe
- » Hepatitis
- » Parvovirose



variabel*

- » Tollwut
- » sonstige Impfungen

ACHTUNG: Unterschiedliche Lebens- und Haltungssituationen sowie Reisen ins Ausland müssen in die **individuelle Impfberatung** einbezogen werden. Impfempfehlungen sowie die Abstände von Wiederholungsimpfungen erfolgen im Gespräch mit dem Haustierarzt/der Haustierärztin bei der jährlichen Vorsorgeuntersuchung sowie ggf. nach einer Titerbestimmung.

* unterschiedlich je nach Herstellerangabe

** Anstatt der „SHP“-Wiederholungsimpfung ist auch eine Titerbestimmung möglich.